

## **ДІЇ ПРИ ВИЯВЛЕННІ СИМПТОМІВ ХВОРОБИ ПІД ЧАС ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ**

1. При виявленні симптомів хвороби (температура тіла вище 37,1°C, кашель, осиплість голосу, почервоніння очей) учню одягають медичну маску, проводять його в ізоляційну кімнату та повідомляють батьків або опікунів. Сповіщають медичного працівника закладу для надання медичної допомоги на догоспітальному етапі.

2. При виявленні симптомів хвороби (температура тіла вище 37,1°C, кашель, осиплість голосу, почервоніння очей) у працівника закладу, він/вона негайно відсторонюється від роботи. За можливості, він/вона самостійно повертається до дому та негайно звертається до сімейного лікаря. За тяжкого стану, на працівника одягається медична маска, він/вона відправляється в ізоляційну кімнату, де чекає прибуття машини «Швидкої допомоги».

3. Після вилучення особи з симптомами інфекційного захворювання в тих приміщеннях, де перебувала така особа, проводиться провітрювання поза графіком та дезінфекція висококонтактних поверхонь.

4. У випадку підтвердження в учня або працівника закладу COVID-19, проводиться визначення кола контактних осіб. Усі контактні особи відправляються на самоізоляцію під медичний нагляд сімейного лікаря на 14 днів з дня останнього контакту з особою, в якій підтверджений випадок COVID-19.

# COVID-19 ТА ГРИП



ЦЕНТР  
ГРОМАДСЬКОГО  
ЗДОРОВ'Я

## СПІЛЬНЕ

Схожа клінічна картина:  
респіраторне захворювання  
різної тяжкості

Краплинний шлях  
передавання

## ВІДМІННЕ

Грип має коротший інкубаційний  
період, поширюється швидше, ніж  
COVID-19

У випадку COVID-19 діти  
інфікуються рідше, ніж дорослі

Смертність від COVID-19  
є вищою за рівень смертності  
внаслідок грипу

Вакцина від грипу неефективна  
проти нового коронавірусу

Ліцензованих вакцин або  
терапевтичних засобів проти COVID-19  
ще немає